

**NASKAH PUBLIKASI**

**DAYA TOLAK INFUSA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus  
amaryllifolius* Roxb.) TERHADAP PELETAKAN TELUR NYAMUK  
AEDES SPP.**

**ANGGIE CAHYADI**

**NIM 111108058**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PONTIANAK**

**2013**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

DAYA TOLAK INFUSA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius*  
Roxb.) TERHADAP PELETAKAN TELUR NYAMUK AEDES SPP.

Tanggung Jawab Yuridis Material Pada

ANGGIE CAHYADI

I11108058

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Hj. Sri Wahdaningsih, MSc, Apt  
NIP. 198111012008012001

dr. Diana Natalia  
NIP. 197912242008122002

Penguji Pertama

Penguji Kedua

dr. Abror Irsan, MMR  
NIP. 198511112010121004

Indri Kusharyanti, Msc, Apt  
NIP. 198303112006042001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Tanjungpura

dr. Sugito Wonodirekso, MS

NIP. 194810121975011001

**OVIPOSITION DETERRENT EFFECTS OF PANDAN LEAVES (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) INFUSA AGAINST AEADES SPP.**

Anggie Cahyadi<sup>1</sup>; Sri Wahdaningsih<sup>2</sup>; Diana Natalia<sup>3</sup>

**Abstract**

**Background.** *Aedes* spp larval resistance against chemical insecticide has been reported in many country. The new methods that can be used to control the mosquito populations as a dengue fever vector and alternative compound which is safe for environment and can't cause the resistance need to be found. Pandan leaves have aromatic fragrant that can be expected as a oviposition deterrent effect against *Aedes* spp mosquito.

**Objective.** To know oviposition deterrent effects and optimum concentration of pandan leaves (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) infusa against *Aedes* spp.

**Methodology.** This research was an experimental research using six groups of concentration. There was 0 mL/L (control), 3 mL/L, 3,5 mL/L, 4 mL/L, 4,5 mL/L and 5 mL/L. Every groups would be repeated by fourth. Ovitrap with different concentration of pandan leaves infusa placed at research location. The mosquito eggs that caught at the ovitrap would be counting and identifying in the laboratorium. Data was analyzed using One Way Anova test via computer program SPSS 19.0 and then continued by LSD test with 95% confidence level.

**Result.** The repellency percentage at 3 mL/L concentration is 30.35%; 3,5 mL/L is 55.35%; 4 mL/L is 65.17%; 4,5 mL/L is 82.14% and 5 mL/L is 100% with significancy value is 0,000 ( $p < 0,05$ ).

**Conclusion.** Pandan leaves (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) infusa has oviposition deterrent effects against *Aedes* spp. and the optimum concentration is at 4,5 – 5 mL/L.

**Keywords:** Oviposition deterrent effects, *Pandanus amaryllifolius* Roxb., oviposition, *Aedes* spp.

- 
- 1) Medical School, Faculty of Medicine, Tanjungpura University, Pontianak, West Kalimantan.
  - 2) Department of Biology Pharmacy, Faculty of Medicine, Tanjungpura University, Pontianak, West Kalimantan.
  - 3) Departement of Parasitology, Medical School, Faculty of Medicine, Tanjungpura University, Pontianak, West Kalimantan.

# DAYA TOLAK INFUSA DAUN PANDAN WANGI (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) TERHADAP PELETAKAN TELUR NYAMUK AEDES SPP.

Anggie Cahyadi<sup>1</sup>; Sri Wahdaningsih<sup>2</sup>; Diana Natalia<sup>3</sup>

## Intisari

**Latar Belakang.** Resistensi larva nyamuk *Aedes spp.* terhadap insektisida kimiawi telah dilaporkan diberbagai negara. Perlu dicari cara baru yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi nyamuk sebagai vektor penyebab penyakit demam berdarah dan bahan alternatif yang aman bagi lingkungan dan tidak menimbulkan terjadinya resistensi. Tanaman pandan wangi memiliki bau khas aromatik yang diharapkan memiliki potensi terhadap penolakan peletakan telur nyamuk *Aedes spp.*

**Tujuan.** Mengetahui daya tolak dan konsentrasi optimum infusa daun tanaman pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) terhadap peletakan telur nyamuk *Aedes spp.*

**Metodologi.** Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental menggunakan enam kelompok perlakuan konsentrasi. Konsentrasi infusa daun pandan wangi yang digunakan pada penelitian ini adalah 0 mL/L (kontrol), 3 mL/L, 3,5 mL/L, 4 mL/L, 4,5 mL/L dan 5 mL/L. Masing-masing konsentrasi diulang sebanyak 4 kali. Uji penolakan dilakukan dengan memasang perangkap telur nyamuk yang telah di isi infusa dengan konsentrasi perlakuan pada lokasi penelitian. Telur nyamuk yang terperangkap kemudian diidentifikasi dan dihitung di laboratorium. Data diolah menggunakan uji *One Way Anova* melalui program komputer SPSS 19.0 dan dilanjutkan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95%.

**Hasil.** Persentase daya tolak pada konsentrasi 3 mL/L adalah 30.35%; 3,5 mL/L sebesar 55.35%; 4 mL/L sebesar 65.17%; 4,5 mL/L sebesar 82.14% dan 5 mL/L sebesar 100% dengan nilai *significancy* sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ).

**Kesimpulan.** Infusa daun tanaman pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) memiliki daya tolak terhadap peletakan telur nyamuk *Aedes spp.* dengan konsentrasi optimum berada pada kisaran 4,5 – 5 mL/L.

**Kata Kunci:** Daya tolak, *Pandanus amaryllifolius* Roxb., peletakan telur, *Aedes spp.*

- 
- 1) Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat.
  - 2) Biologi Farmasi, Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat.
  - 3) Departemen Parasitologi, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat.

## PENDAHULUAN

Berbagai faktor kependudukan berpengaruh pada peningkatan dan penyebaran kasus DBD, antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi; urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali; tidak efektifnya kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis dan peningkatan sarana transportasi.<sup>1</sup>

Upaya pengendalian terhadap faktor kependudukan tersebut (terutama kontrol vektor nyamuk) harus diupayakan, disamping pemberian terapi yang optimal pada penderita DBD, dengan tujuan menurunkan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit ini.<sup>1</sup> Bentuk pengendalian ini dapat dilakukan secara mekanik, biologi, kimia, atau perubahan sifat genetik. Pengendalian yang paling populer saat ini adalah pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida karena bekerjanya lebih efektif dan hasilnya cepat terlihat bila dibandingkan dengan pengendalian biologis.<sup>2</sup>

Resistensi terhadap temephos dan organofosfat yang merupakan bahan aktif dari bubuk Abate telah dilaporkan di beberapa negara, seperti Brazil, Thailand, Kuba dan Argentina.<sup>3-6</sup> Dari penelitian Damar dan Widiarti<sup>7</sup> tahun 2005, dilaporkan adanya resistensi sebagian populasi nyamuk *Aedes aegypti* di beberapa daerah di DI Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dari penelitian Intan dkk<sup>8</sup> tahun 2007 ditemukan adanya resistensi nyamuk *Aedes aegypti* di daerah Surabaya, Bandung dan Palembang. Resistensi terhadap beberapa jenis insektisida seperti deltamethrin, malathion, permethrin dan pyrethroid juga dilaporkan di Thailand.<sup>9,10</sup>

Perlu dicari cara baru dan bahan alternatif yang dapat dipakai untuk mengendalikan populasi nyamuk sebagai vektor penyebab penyakit demam berdarah yang aman bagi lingkungan dan tidak menimbulkan terjadinya resistensi. Tanaman pandan wangi memiliki bau khas aromatik

yang diharapkan memiliki potensi terhadap penolakan peletakan telur nyamuk *Aedes spp.* sehingga diharapkan dapat memutus rantai perkembangbiakan atau perindukan nyamuk tersebut yang pada akhirnya dapat mengendalikan populasi vektor nyamuk penyebab penyakit DBD.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental sederhana dengan rancangan *post test only group control design*. Penelitian dilakukan di Jalan Flores, Kelurahan Akcaya, Pontianak Selatan, dan Laboratorium Hama dan Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura pada bulan Februari 2012 – April 2013.

Pada penelitian ini, subjek dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok I disebut kelompok perlakuan dengan konsentrasi infusa yang berbeda dan kelompok II disebut kelompok kontrol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancang acak kelompok (RAK), yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan enam macam konsentrasi/dosis perlakuan, untuk setiap perlakuan masing-masing dilakukan empat kali pengulangan. Konsentrasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 0 mL/L (sebagai kontrol), 3 mL/L, 3,5 mL/L, 4 mL/L, 4,5 mL/L dan 5 mL/L. Daun pandan wangi sebanyak 100 gram dibersihkan dan dirajang sampai halus. Selanjutnya daun dimasukkan kedalam panci infus, kemudian ditambahkan akuades sebanyak 200 ml, dipanaskan selama 15 menit dihitung setelah suhu mencapai 90°C.

Uji penolakan dilakukan dengan memasang perangkap telur nyamuk yang telah di isi infusa dengan konsentrasi perlakuan pada lokasi penelitian. Telur nyamuk yang terperangkap kemudian diidentifikasi dan dihitung di laboratorium. Persentase daya tolak kemudian dihitung dengan rumus standar dari Xue<sup>11</sup>, sebagai berikut:

$$\text{Daya Tolak (\%)} = \frac{C - T}{C} \times 100$$

dimana C adalah jumlah rata-rata telur nyamuk yang terperangkap dalam perangkap kontrol, dan T adalah jumlah rata-rata telur nyamuk yang terperangkap dalam perangkap dengan perlakuan.

Data diolah menggunakan uji *One Way Anova* melalui program komputer SPSS 19.0 dan dilanjutkan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95%.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Pendahuluan**

Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui konsentrasi perlakuan yang memiliki efek daya tolak sebanyak 50% dari jumlah telur nyamuk yang terperangkap pada kelompok kontrol. Berdasarkan hasil dari uji pendahuluan dapat dilihat persentase daya tolak untuk peletakan telur nyamuk *Aedes spp.* sebesar  $\pm 50\%$  dari jumlah telur nyamuk yang terdapat pada kelompok kontrol adalah pada konsentrasi 4 mL/L, ini berarti konsentrasi ini menjadi acuan untuk menentukan kisaran-kisaran interval konsentrasi yang digunakan pada uji sesungguhnya.

Hasil uji pendahuluan dari efek daya tolak infusa daun pandan wangi terhadap peletakan telur nyamuk *Aedes spp.* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daya Tolak Pada Uji Pendahuluan Infusa Daun Pandan Wangi Terhadap Peletakan Telur Nyamuk Aedes spp.

Kelompok Perlakuan	Konsentrasi	Jumlah Telur	% Daya Tolak
Kontrol	0 mL/L	27	-
P1	2 mL/L	16	40.74 %
P2	4 mL/L	13	51.85 %
P3	6 mL/L	0	100 %
P4	8 mL/L	0	100 %
P5	10 mL/L	0	100 %

(Sumber: Data Primer, 2013)

### Uji Sebenarnya

Kisaran interval konsentrasi yang digunakan pada uji sebenarnya diperoleh dengan cara menaikkan atau menurunkan nilai konsentrasi acuan pada uji pendahuluan, di mana jarak interval tidak terlalu jauh. Kisaran interval konsentrasi yang digunakan pada uji sebenarnya adalah 0 mL/L (kontrol), 3 mL/L, 3,5 mL/L, 4 mL/L, 4,5 mL/L dan 5 mL/L. Hasil penelitian pada uji sebenarnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Daya Tolak Pada Uji Sebenarnya Infusa Daun Pandan Wangi Terhadap Peletakan Telur Nyamuk Aedes spp.


Kelompok Perlakuan	Konsentrasi	Jumlah Telur Pada Pengulangan Ke-				Rata-rata	% Daya Tolak
		1	2	3	4		
Kontrol	0 mL/L	27	29	25	31	28	-
P1	3 mL/L	17	19	22	20	19,5	30.35%
P2	3,5 mL/L	14	13	16	11	13,5	55.35%



P3	4 mL/L	11	10	10	8	9,75	65.17%
P4	4,5 mL/L	5	6	4	5	5	82.14%
P5	5 mL/L	0	0	0	0	0	100%


(Sumber: Data Primer, 2013)

Data pada Tabel 2 memperlihatkan kenaikan persentase daya tolak disetiap kenaikan konsentrasi infusa. Hal ini berarti apabila konsentrasi infusa meningkat, maka daya tolak terhadap peletakan telur nyamuk juga akan meningkat (lihat gambar 1 dan 2). Dari tabel juga diketahui bahwa konsentrasi minimum yang masih dapat menolak peletakan telur nyamuk berada pada kisaran 5 mL/L dengan persentase daya tolak sebesar 100%. Penelitian Xue dkk<sup>11</sup> menyebutkan bahwa daya tolak terhadap peletakan telur nyamuk dikatakan efektif jika persentase daya tolaknya berkisar antara 80 – 100%. Sehingga pada penelitian ini, konsentrasi optimum yang efektif sebagai penolakan telur nyamuk berada pada kisaran 4,5 hingga 5 mL/L.



Gambar 1. Diagram garis yang menunjukkan rata-rata jumlah telur pada tiap konsentrasi infusa  
(Sumber: Data Primer, 2013)

Gambar 1 menunjukkan diagram garis yang memperlihatkan rata-rata jumlah telur pada tiap konsentrasi infusa. Terjadi penurunan grafik pada setiap kenaikan konsentrasi infusa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi infusa, maka rata-rata jumlah telur nyamuk akan menurun. Gambar 2 menunjukkan diagram garis yang memperlihatkan persentase daya tolak infusa pada tiap konsentrasi. Terjadi kenaikan grafik pada setiap kenaikan konsentrasi infusa. Hal ini berarti persentase daya tolak semakin meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi infusa.



Gambar 2. Diagram garis yang menunjukkan persentase daya tolak infusa pada tiap konsentrasi (Sumber: Data Primer, 2013)

### Analisis Statistik

Pada uji *One-Way ANOVA*, nilai *significancy* menunjukkan angka 0,000 ( $p < 0,05$ ) yang artinya paling tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah telur yang bermakna pada dua kelompok konsentrasi. Untuk mengetahui kelompok perlakuan mana yang terdapat perbedaan bermakna, dilakukan analisis *Post-Hoc* dengan menggunakan *LSD*. Uji *Post-Hoc* menunjukkan terdapat perbedaan jumlah telur yang berbeda secara bermakna pada semua kelompok perlakuan (nilai  $p < 0,05$  dengan Indeks Kepercayaan 95% tidak tercakup angka 0).

### Preparasi Sampel dan Pembuatan Infusa

Pada penelitian ini, bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun. Hal ini dikarenakan zat-zat kimia dan metabolit sekunder pada tanaman ini disimpan di dalam vakuol yang terdapat di seluruh permukaan daun.<sup>12</sup>

Daun dipisahkan dari akar lalu dibersihkan dari sisa-sisa tanah dan kotoran kemudian dicuci dengan air yang bersih dan mengalir. Selanjutnya daun dikering anginkan. Daun tanaman diambil pada pagi hingga siang hari dengan cahaya matahari yang cukup. Hal ini dikarenakan tanaman mengalami proses fotosintesis maksimal pada pagi hingga siang hari. Tanaman daun pandan memiliki stomata yang terbuka pada pagi hingga siang hari dan menutup pada sore dan malam hari.<sup>13</sup> Sehingga proses fotosintesis maksimal terjadi pada waktu-waktu tersebut dan pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan metabolit sekunder yang lebih banyak.

Tanaman kemudian dirajang hingga halus. Hal ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan tanaman sehingga zat aktif yang dapat ditarik oleh zat penyari menjadi lebih banyak.<sup>14</sup> Pembuatan infusa menggunakan dua buah panci yang saling bertumpuk, dimana panci yang di atas diisi bahan yang akan diekstraksi, dimana bahan pada penelitian ini adalah daun pandan dan zat penyarinya, yaitu air. Panci yang di bawah hanya diisi air, yang berkontak langsung dengan api. Ketika panci yang dibawah airnya mendidih hingga 100°C, maka panas yang diterima oleh panci atas hanya bersuhu 90°C saja. Kondisi demikian ini diperlukan agar zat aktif dalam bahan tidak rusak oleh panas berlebihan. Infusa yang telah jadi kemudian didinginkan dan disaring menggunakan kain flanel. Pendinginan dilakukan karena tanaman daun pandan wangi mengandung minyak atsiri yang mudah menguap apabila disaring dalam keadaan panas.

### **Peletakan Perangkap Telur Nyamuk dan Identifikasi Telur Nyamuk**

Perangkap telur nyamuk yang telah diberi infusa sesuai dengan konsentrasi yang digunakan kemudian diletakkan pada lokasi penelitian

yang terlindung dari sinar matahari langsung. Hal ini sesuai dengan penelitian Neneng dkk<sup>15</sup> yang menunjukkan bahwa lokasi yang paling banyak ditemukan larva dan telur nyamuk Aedes adalah tempat-tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Suhu udara yang diperlukan nyamuk untuk meletakkan telurnya berada pada temperatur sekitar 20 - 30° C. Berdasarkan catatan empiris dari Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dan Stasiun Klimatologi Siantan Kabupaten Pontianak, umumnya suhu udara di daerah Kalimantan Barat cukup normal namun bervariasi, yaitu rata-rata sekitar 25,8° C sampai dengan 28,3° C. Jadi, lokasi pada penelitian ini memenuhi syarat untuk nyamuk meletakkan telurnya.

Pengamatan dan pencatatan dilakukan pada 24 – 48 jam pertama setelah peletakan perangkap. Hal ini dikarenakan telur nyamuk akan menetas dalam waktu 1 – 2 hari setelah peletakannya.<sup>16</sup> Semua telur nyamuk yang terperangkap kemudian diidentifikasi di laboratorium. Identifikasi telur nyamuk dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 4x hingga 10x. Identifikasi bertujuan untuk membedakan telur nyamuk Aedes dengan telur nyamuk lain atau benda asing yang bentuknya mirip dengan telur nyamuk yang dapat membuat kesalahan dalam perhitungan jumlah telur nyamuk. Pengamatan di laboratorium menunjukkan adanya telur Aedes yang khas yang berbentuk bulat lonjong, berwarna hitam dan soliter (lihat gambar 7).



Gambar 3. Telur Aedes berbentuk bulat lonjong dan berwarna hitam (perbesaran 10x).

Hal ini berbeda dari morfologi telur nyamuk Anopheles yang mempunyai pelampung pada kedua sisinya dan nyamuk Culex yang bergerombol seperti peluru.<sup>17-19</sup>



(a)



(b)

Gambar 4. (a): Telur nyamuk Culex yang bergerombol; (b): Telur nyamuk Anopheles yang memiliki pelampung pada kedua sisinya. (perbesaran 10x)<sup>17,19</sup>

## **Efek Daya Tolak Infusa Daun Pandan Wangi Terhadap Peletakan Telur Nyamuk *Aedes* spp.**

Daun pandan mengandung alkaloida, saponin, flavonoida, tannin, polifenol dan zat warna.<sup>20</sup> Berdasarkan penelitian Hastuti<sup>21</sup> diketahui bahwa saponin dan polifenol dapat menghambat bahkan membunuh larva nyamuk. Saponin dapat merusak membran sel dan mengganggu proses metabolisme serangga, sedangkan polifenol sebagai inhibitor pencernaan serangga. Apabila polifenol termakan oleh serangga, maka zat tersebut akan menurunkan kemampuan serangga dalam mencerna makanan.

Bau khas pada daun pandan disebabkan oleh kandungan minyak atsiri dan senyawa kimia yang disebut *2-acetyl pyrroline*.<sup>22</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Listyawati dkk<sup>23</sup> menemukan bahwa senyawa-senyawa penyusun aroma daun pandan wangi segar (berdasarkan Spektra dari Spektroskopi-Massa) adalah Limonen, C<sub>14</sub>H<sub>30</sub> Tetradekana dan Fenol 2,6-bis (1,1-dimetil)-4-metil. Penelitian Zaki dkk<sup>24</sup> di Malaysia menunjukkan bahwa Limonen merupakan senyawa aromatik yang ditemukan pada kulit jeruk dan lemon yang telah terbukti efektif sebagai penolak gigitan nyamuk *Aedes*.

Untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar, nyamuk menggunakan reseptor sensoris yang terdapat di bagian tubuhnya, seperti reseptor penglihatan, pendengaran, mekanoreseptor dan kemoreseptor (reseptor kimia).<sup>25</sup> Untuk mengetahui lokasi tempat bertelur dan mencari makan, nyamuk akan menangkap sinyal kimia yang ada di udara (*airborne chemical signal*) atau sinyal bau.<sup>26</sup> Sinyal ini merupakan stimulus yang paling berpengaruh dalam pola tingkah laku nyamuk.<sup>27</sup> Senyawa-senyawa ini akan menempel pada reseptor bau (*odorant receptor*) yang terletak di antenadan palpi maksilaris nyamuk.

Beberapa senyawa yang telah diketahui berfungsi sebagai atraktan (penarik) dalam mencari makan (*host-seeking*) adalah karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan asam laktat. Sedangkan produk sisa dari bakteri dan bahan organik lain yang terdapat di dalam air merupakan senyawa atraktan yang akan ditangkap oleh reseptor dan akan dikenali sebagai tempat bertelur yang cocok. Pada nyamuk *Aedes* dan *Anopheles*, senyawa *3-methylindole* dan *ethyl propionate* merupakan atraktan paling kuat untuk meletakkan telurnya.<sup>27</sup>

Secara umum, mekanisme penolakan (*repellent*) terhadap nyamuk adalah dengan mengganggu atau memblokir reseptor bau ini. Contohnya DEET (*N,N-diethyl-3-methyl benzamide*) yang merupakan penolak atau *repellent* sintesis yang telah digunakan secara luas, bekerja dengan memblokir reseptor bau yang ada pada nyamuk. Pada nyamuk *Aedes*, reseptor yang diblokir adalah reseptor OR83b. Hal ini akan menurunkan ambang sensitivitas reseptor bau tersebut terhadap stimulus dari senyawa atraktan yang lain.<sup>28-30</sup>

Senyawa aromatik yang terdapat pada beberapa tanaman juga bekerja dengan cara memblokir reseptor OR83b, seperti *citronella* dan *geraniol* pada tanaman sereh wangi (*Cymbopogon nardus*), PMD (*para-methane 3-8, diol*) dan limonen pada kulit buah lemon (*Corymbia citriodora*).<sup>28</sup> Senyawa aromatik utama pada tanaman pandan wangi adalah *2-acetyl pyrroline* dan limonen. Senyawa-senyawa inilah yang kemungkinan berperan dalam penolakan peletakan telur nyamuk.



## KESIMPULAN

1. Infusa daun tanaman pandan wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) memiliki daya tolak terhadap peletakan telur nyamuk *Aedes* spp.
2. Konsentrasi optimum yang efektif sebagai penolakan telur nyamuk berada pada kisaran 4,5 hingga 5 mL/L.

## SARAN

1. Penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa spesifik pada daun pandan wangi dan mekanisme kerjanya sebagai penolak nyamuk.
2. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sediaan lain dari daun pandan wangi seperti minyak esensial atau *lotion* sebagai penolak gigitan nyamuk.
3. Penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi daun pandan wangi sebagai larvasida jentik nyamuk.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Chen K, Pohan HT, Sinto R. Diagnosis dan Terapi Cairan pada Demam Berdarah Dengue. *Medicinus*. 2009;1(22):3-7.
2. Susanna D, Rahman A, Pawenang ET. Potensi Daun Pandan Wangi Untuk Membunuh Larva Nyamuk *Aedes aegypti*. *Jurnal Ekologi Kesehatan*. 2003;2(2):228-31.
3. Jose BPL, Marcella PDaC, Ronaldo CDaSJ, Allan KRG, Sidinei DaSS, Ima AB, dkk. Resistance of *Aedes aegypti* to organophosphate in Several Municipalities in the State of Rio De Janeiro and Espirito Santo, Brazil. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*. 2003;68(3):329-33.

4. Pungasem P, Narumon K, Vanida D, Yupha R, Yuki E, Supatra T. Temephos Resistance in Two Forms of *Aedes aegypti* and Its Significance for The Resistance Mechanism. Southeast Asian Journal of tropical Medicine and Public Health. 2003;34(4):786-92.
5. Angela FH, Shavanti R, Hilary R. Pyrethroid Resistance in *Aedes aegypti* from Grand Cayman. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2010;83(2):277-84.
6. Emilia S, Alejandro L, Eduardo Z, Susana L, Hector M. *Aedes aegypti* Resistance to Temephos in Argentina. Journal of the American Mosquito Control Association [internet]. 2008 [diakses tanggal 13 Januari 2012] 24(4):[sekitar 1 halaman]. Tersedia di: <http://dx.doi.org/10.2987/5738.1>
7. Damar TB, Widiarti. Susceptibility of Dengue Haemorrhagic Fever Vector (*Aedes aegypti*) Against Organophosphate Insecticides (Malathion and Temephos) in Some Districts of Yogyakarta and Central Java Provinces. Vector and Reservoir Control Research Unit Salatiga. 2005
8. Intan A, Sita A, Marselina T. Resistance of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in 2006 to Pyrethroid Insecticides in Indonesia and Its Association with Oxidase and Esterase Levels. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2007;10(20):3688-92.
9. Rapeeporn Y, Rachada K, Theeraphap C, Pornpimol R. Characterization of Deltamethrin Resistance in Fields Populations of *Aedes aegypti* in Thailand. Journal of Vector Ecology. 2005;30(1):144-50.
10. Alongkot P, Jeffrey GS, Laura CH. Insecticide Susceptibility of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* Across Thailand. Journal of Medical Entomology [internet]. 2005 [diakses tanggal 13 Januari 2012];42(5): [sekitar 1 halaman.]. Tersedia di: [http://dx.doi.org/10.1603/0022-2585\(2005\)042\[0821:ISOAA\]2.0.CO;2](http://dx.doi.org/10.1603/0022-2585(2005)042[0821:ISOAA]2.0.CO;2)
11. Tawatsin A, Asavadachanukorn P, Thavara U, Wongsinkongman P, Bansidhi J, Boonruad T dkk. Repellency of Essential Oils Extracted from Plants in Thailand Against Four Mosquito Vectors (Diptera: Culicidae) and Oviposition Deterrent Effects Against *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae). Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2003;37(5):915-3

12. Wakte KV, Nadaf AB, Krishnan F dan Thengane RJ. Studies on Lower Epidermal Papillae, The Site Of Storage Of Basmati Rice Aroma Compunds on *Pandanus amaryllifolius* Roxb. Current Sciences. 2007;93(2):238-42.
13. Tomlinson PB. A Study of Stomatal Structure in Pandanaceae. Pacific Science. 1965;19(2):38-54.
14. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sediaan Galenik. Jakarta: DepKes RI; 1986.
15. Syarifah N, Rusmatini T, Djatie T, Huda F. Ovitrap Ratio of *Aedes aegypti* Larvae Collected Inside and Outside Houses in a Community Survey to Prevent Dengue Outbreak, Bandung, Indonesia, 2007. Prociding ASEAN Congress Tropics and Medical Parasitology. 2008;3:116-20.
16. Depkes RI. Perilaku Hidup Nyamuk *Aedes aegypti* Sangat Penting Diketahui Dalam Melakukan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk Termasuk Pemantauan Jentik Berkala [internet] 2004 [diakses tanggal 13 januari 2012]. Tersedia di: <http://www.depkes.go.id/downloads/Bulletin%20Harian%2010032004.pdf>
17. Sutanto I, Ismid SI, Sjarifuddin PK, Sungkar S. Buku Ajar Parasitologi Kedokteran. Edisi ke-4. Jakarta: FKUI; 2008.
18. Hinton HE. Observations on The Biology and Taxonomy of The Eggs of *Anopheles* Mosquitos. Bulletin of Entomological Research. 1968;57:495-508.
19. Linley JR, Geary MJ dan Russel RC. The Eggs of *Aedes alboannulatus* and *Aedes rubrithorax* (Diptera: Culicidae). Mosquito Systematics. 1991;23(2):132-43.
20. Dalimartha S. Atlas Tumbuhan Obat Indonesia. Jilid 1. Jakarta : Trubus Agriwidya; 2003.
21. Hastuti H. Daya Bunuh Ekstrak Daun Pandan Wangi (*Pandanus amaryllifolius* Roxb.) terhadap Larva *Anopheles aconicus* Donitz [Skripsi]. Fakultas Kedokteran: UNS; 2008.
22. Standard of ASEAN Herbal Medicines. Volume II. Jakarta. 2004.

23. Listyawati M, Tranggono dan Suyitno. Pembuatan Dan Karakterisasi Bubuk Pandan Wangi Siap Pakai. *Agrosains*. 1999;12(2):133-44.
24. Zaki MZ, Ali M, Ahmad AS, Patah MF, Hassan H, Jamil IK dkk. Four Monoterpene Compounds: Repellency Evaluation Against *Aedes aegypti*. *Malaysian Journal of Sciences*. 2000;24(1):69-78.
25. Bowen MF. The Sensory Physiology of Host-Seeking Behaviour in Mosquitoes. *Annual Reviews Entomology*. 1991;36:139-58.
26. Leite NR, Krogh R, Xu W, Ishida Y, Iulek J, Leal WS dkk. Structure of an Odorant-Binding Protein from The Mosquito *Aedes aegypti* Suggest a Binding Pocket Covered by a pH-Sensitive "Lid". *Plos One*. 2009;4(11):1-7.
27. Takken W dan Knols BGJ. Odor-Mediated Behaviour of Afrotropical Malaria Mosquitoes. *Annual Review Entomology*. 1999;44:131-57.
28. Maia MF dan Moore SJ. Plant-Based Insect Repellents: a Review of Their Efficacy, Development and Testing. *Malaria Journal*. 2011;10:1-15.
29. Pelletier J, Hughes DT, Luetje CW dan Leal WS. An Odorant Receptor From The Southern House Mosquito *Culex pipiens quinquefasciatus* Sensitive to Oviposition Attractants. *Plos One*. 2010;5:1-8.
30. Bohbot JD dan Dickens JC. Insect Repellents: Modulators of Mosquito Odorant Receptor Activity. *Plos One*. 2010;5:1-11.