INVENTARISASI *ZINGIBERACEAE* DI KAWASAN HUTAN TEMBAWANG DESA SUMBER KARYA KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG

Veronika Andini^{1*}, Rafdinal¹, Masnur Turnip¹

¹Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat

*Email: veronikaandini25@gmail.com

Abstract

Zingiberaceae is the family of flowering plants commonly known by the people of Indonesia as the Jahe-jahean. This plant is widely used for many things such as spices, medicine, ornamental plants, cosmetic ingredients, beverage ingredients, hair tonic, etc. The aim of the study is to know *Zingiberaceae* species diversity in Tembawang Forest, Sumber Karya Village, Teriak District, Bengkayang City, West Kalimantan. The method of the research used exploration with observation in three Tembawang Forest at Sumber Karya Village. The results showed that there were seven species of *Zingiberaceae* namely *E. coccinea*, *E. elatior*, *E. nasuta*, *G. atrosanguinea*, *H. reticulata*, *Z. multibracteatum*, and *Z. zerumbet*.

Keywords: Bengkayang, Tembawang forest, *Zingiberaceae*

PENDAHULUAN

Zingiberaceae merupakan famili atau suku tumbuhan berbunga yang secara umum dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai jahe-jahean. *Zingiberaceae* banyak ditemukan pada kawasan hutan tropis. Menurut Pandey (2003), terdapat sekitar 50 % dari total genera famili *Zingiberaceae* yang ditemukan di hutan tropis. *Zingiberaceae* dapat hidup dari dataran rendah sampai ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut terutama daerah dengan curah hujan yang tinggi. Sejauh ini daerah yang kaya akan jenis-jenis *Zingiberaceae* adalah wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina dan Papua.

Famili *Zingiberaceae* mempunyai ciri khas pada rhizomnya yang mengandung zat kimia (minyak atsiri). *Zingiberaceae* dimanfaatkan sebagai bumbu masak, obat-obatan, tanaman hias, bahan kosmetik, bahan minuman, dan sebagainya. *Zingiberaceae* yang paling banyak dimanfaatkan terdapat pada genera *Alpinia*, *Amomum*, *Curcuma*, *Zingiber*, *Boesenbergia*, *Kaempferia*, *Elettaria*, *Elettariopsis*, *Etlingera* dan *Hedychium*. Beberapa jenis *Curcuma* dapat digunakan untuk mengobati gigitan ular dan anti tumor. Kandungan minyak atsiri dalam *Zingiber* dapat dimanfaatkan sebagai obat dan memiliki aroma yang khas (Larsen *et al.*, 1999).

Kawasan hutan tembawang atau sering disebut sebagai agroforest tembawang. Kawasan hutan tembawang merupakan suatu sistem pengelolaan tanaman hutan yang dikombinasi dengan pertanian. Sistem tembawang merupakan perpaduan tengkawang (pohon buah) dan pohon kayu baik yang berasal dari bekas kampung yang telah ditinggalkan

maupun lokasi yang sengaja ditanam pohon buah-buahan (Harum, 2012).

Kawasan hutan tembawang di Desa Sumber Karya Kabupaten Bengkayang terdiri dari tiga hutan tembawang yakni, hutan tembawang Sibon, hutan tembawang Beringin dan hutan tembawang Nameng. Berdasarkan survey yang telah dilakukan pada kawasan tersebut banyak ditemukan jenis-jenis *Zingiberaceae*, namun belum ada data tentang jenis-jenis *Zingiberaceae* di Kawasan Tembawang Desa Sumber Karya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Inventarisasi *Zingiberaceae* di Kawasan Hutan Tembawang Desa Sumber Karya, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis *Zingiberaceae* dan data hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi dasar mengenai jenis *Zingiberaceae* di Kawasan Hutan Tembawang, Desa Sumber Karya, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari Agustus hingga Oktober 2019. Penelitian dilakukan di Kawasan Hutan Tembawang Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. Identifikasi dan pembuatan herbarium dilakukan di Laboratorium Biologi, FMIPA, Universitas Tanjungpura.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian

Kawasan Hutan Tembawang Desa Sumber Karya terdapat tiga kawasan tembawang yaitu Kawasan Hutan Tembawang Sibon, Hutan Tembawang Beringin dan Hutan Tembawang Nameng. Desa Sumber Karya secara geografis terletak pada titik koordinat $0^{\circ}48'42''$ - $0^{\circ}44'35''$ Lintang Utara $109^{\circ}35'00''$ - $109^{\circ}40'27''$ Bujur Timur (Gambar 1). Secara administratif Desa Sumber Karya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Telidik
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebujur

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan adalah alat tulis, benang jahit, cangkuk kecil, GPS (*Global Positioning System*), etiket gantung, gunting, jarum jahit, kamera, kardus, kertas label, kertas karton, kertas koran, kertas manila putih, plastik bening, plastik penyimpanan sasak, selotip, sprayer, termometer, tabel karakter stet, dan toples. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alkohol 70%, spirtus dan tumbuhan *Zingiberaceae* yang ditemukan. Alat dan bahan selanjutnya yaitu buku identifikasi.

Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel tumbuhan *Zingiberaceae* dilakukan di Kawasan Tembawang, Desa Sumber Karya, Kabupaten Bengkayang melalui observasi lapangan secara langsung dengan menggunakan metode jelajah (*Cruise Method*), yaitu dengan menjelajahi setiap sudut lokasi yang dapat mewakili tipe-tipe ekosistem ataupun vegetasi di kawasan yang diteliti (Rugayah *et al.*, 2004). Metode jelajah yang dilakukan yaitu penjelajahan di sepanjang jalur yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Pengambilan contoh herbarium pada lokasi penelitian hanya dilakukan sekali untuk setiap jenisnya. Apabila ditemukan jenis yang sama maka hanya dilakukan pendataan pada jenis tersebut.

Pengambilan sampel tumbuhan lengkap terdiri atas daun, batang, bunga (bila ada), buah (bila ada), akar maupun rimpang. Setelah itu dilakukan pencatatan karakter tumbuhan *Zingiberaceae* ke dalam tabel karakteristik mengenai tanggal pengambilan sampel, nama daerah, habitat, letak rhizome, bau rhizome, warna kulit rhizome, warna sisik rhizome, tinggi batang, permukaan batang, warna daun, bentuk ujung daun, bentuk pangkal daun, pertulangan daun, permukaan daun, warna bunga, bau bunga, letak bunga dan warna buah, dan ciri lain yang akan hilang bila dikeringkan. Selanjutnya dilakukan pengambilan foto pada bagian tanaman yang dianggap penting. Kemudian, sampel dikoleksi dan diberi label.

Pembuatan Herbarium

Pembuatan herbarium dilakukan terhadap jenis *Zingiberaceae* yang belum diketahui jenisnya sedangkan jenis *Zingiberaceae* yang sudah umum atau sudah diketahui jenisnya, diambil fotonya, dicatat nama ilmiahnya dan nama daerahnya. Pembuatan herbarium kering dilakukan dengan penge-ringan spesimen dan penempelan spesimen. Spesimen berupa daun, batang, akar maupun rimpang, diletakkan di atas kertas koran dan disemprotkan dengan alkohol 70% hingga basah. Spesimen diatur diantara kertas koran, setiap satu lipatan koran terdapat satu spesimen. Lipatan koran berisi spesimen tersebut ditumpuk jadi satu kemudian ditekan dengan kardus dan sasak, lalu dikeringanginkan (Onrizal, 2005).

Penempelan spesimen yang telah kering, satu persatu diletakan di atas kertas karton atau kertas manila putih, berukuran 30 cm x 40 cm. Spesimen selanjutnya dijahit rapi, diberi label berisi deskripsi singkat dan dibungkus dengan plastik bening. Karakter spesimen yang diperoleh dicatat pada etiket gantung yang berisi mengenai nomor koleksi, nama kolektor, nama lokal, nama ilmiah, tanggal koleksi, dan deskripsi tumbuhan (Steenis, 2005).

Herbarium basah dilakukan dengan cara mengambil organ tumbuhan yang penting untuk identifikasi seperti bunga dan buah. Organ bunga dan buah dipisahkan lalu dibersihkan. Herbarium basah kemudian dimasukan ke dalam toples yang berisi spirtus atau alkohol 70% dan diberi keterangan pada bagian luarnya meliputi nomor koleksi, nama kolektor, nama lokal, nama ilmiah, tanggal koleksi, dan deskripsi habitat.

Identifikasi sampel

Identifikasi sampel tumbuhan *Zingiberaceae* dilakukan dengan mencocokkan karakteristik dan

foto sampel. Identifikasi sampel dilakukan setelah pembuatan herbarium, di Laboratorium Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura Pontianak. Identifikasi dengan menggunakan buku identifikasi antara lain: *Etlingera of Borneo* (Poulsen, 2006) dan *A guide to gingers of Borneo* (Lamb et al., 2013).

Penyajian Data

Data yang diperoleh dapat disajikan secara deskriptif dan tabulasi. Data yang disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan karakter jenis *Zingiberaceae* yang ditemukan. Selanjutnya, data yang disajikan dalam bentuk tabulasi untuk menjelaskan karakter jenis *Zingiberaceae* dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan pada kawasan hutan tembawang di Desa Sumber Karya ditemukan tujuh spesies *Zingiberaceae* yang tergolong kedalam empat genus berbeda. Keempat genus tersebut yaitu *Etlingera*, *Globba*, *Hornstedia*, dan *Zingiber*. Ketujuh spesies dan jumlah spesies yang ditemukan dari setiap lokasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Jenis *Zingiberaceae* yang paling banyak ditemukan adalah dari genus *Etlingera* yang terdiri dari tiga jenis. Jenis yang paling sedikit ditemukan berasal dari genus *Globba* dan *Hornstedia* yang masing-masing hanya ditemukan satu jenis. *Zingiberaceae* yang ditemukan di kawasan hutan tembawang Desa Sumber Karya sebagaimana tertera pada Tabel 1 yang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa spesies yang ditemukan sebanyak empat genus dari tujuh spesies dengan jumlah total individu sebanyak 57 individu.

Tabel 1. Jenis *Zingiberaceae* di Kawasan Hutan Tembawang Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang

No	Genus	Spesies	Tembawang			Jumlah
			Sibo	Beringin	Nameng	
1.	<i>Etlingera</i>	<i>Etlingera coccinea</i>	√	√	-	9
		<i>Etlingera elatior</i>	√	√	√	6
		<i>Etlingera nasuta</i>	-	√	-	4
2.	<i>Globba</i>	<i>Globba atrosanguinea</i>	-	√	-	3
3.	<i>Hornstedia</i>	<i>Hornstedia reticulata</i>	√	√	√	18
4.	<i>Zingiber</i>	<i>Zingiber multibracteatum</i>	-	√	-	5
		<i>Zingiber zerumbet</i>	√	-	√	8
Total			4	6	3	57

Keterangan: √ = ada ditemukan *Zingiberaceae*

Tabel 2. Pengukuran Faktor Lingkungan di Kawasan Hutan Tembawang Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang

No	Lokasi Tembawang	Titik Koordinat	Ketinggian (m dpl)	Faktor Lingkungan	
				Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Kelembaban (%)
1.	Tembawang Sibon	N : 0.7213 ⁰ E:109.63205 ⁰	900	26	80.3
2.	Tembawang Beringin	N : 0.7717 ⁰ E:109.64007 ⁰	1100	25	82.0
3.	Tembawang Nameng	N : 0.75311 ⁰ E:109.62239 ⁰	500	27	73.6

Kawasan hutan tembawang di Desa Sumber Karya, Kabupaten Bengkayang memiliki tiga kawasan hutan tembawang, yaitu hutan tembawang Sibon, hutan tembawang Beringin dan hutan tembawang Nameng. Kawasan hutan tembawang Sibon ditemukan empat jenis dari tiga genus yaitu, *E. coccinea*, *E. elatior*, *H. reticulata*, dan *Z. zerumbet*. Kawasan Hutan Tembawang Beringin yang paling banyak jenisnya, terdiri dari enam jenis dari empat genus, yaitu *E. coccinea*, *E. elatior*, *E. nasuta*, *H. reticulata*, *G. atrosanguinea* dan *Z. multibracteatum*. Kawasan Hutan Tembawang Nameng terdiri dari dua jenis dari dua genus yaitu *E. elatior* dan *Z. zerumbet*. Hasil pengukuran faktor lingkungan yang telah dilakukan di lapangan pada kawasan hutan tembawang di Desa Sumber Karya dapat dilihat pada Tabel 2.

Lokasi kawasan hutan tembawang di Desa Sumber Karya merupakan hutan pegunungan bawah sampai dengan 1300 meter di atas permukaan laut. Lokasi tembawang yang diteliti terdiri dari tiga lokasi tembawang yaitu, tembawang Sibon, tembawang Beringin, dan tembawang Nameng. Kawasan hutan tembawang tersebut mempunyai faktor lingkungan seperti suhu 25-27 $^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban 73,6-82 %.

Deskripsi morfologi jenis *Zingiberaceae* di kawasan Hutan Tembawang Desa Sumber Karya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang

Deskripsi jenis *Zingiberaceae* yang ditemukan di kawasan Hutan Tembawang, Desa Sumber Karya, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang menurut Poulsen (2006) sebagai berikut:

Etlingera coccinea (Blume) S.Sakai & Nagam.

E. coccinea yang ditemukan merupakan herba berumpun yang memiliki tinggi tanaman 2 m, rimpang tumbuh menjalar dibawah permukaan tanah, bentuk rimpang berdaging berwarna putih, beraroma tajam. Batang (*pseudostem*) tegak

memanjang secara horizontal, berwarna kekuningan dengan permukaan yang kasap. Daun (*lamina*) merupakan daun majemuk, tersusun berselang, dengan bentuk memanjang, permukaan atas dan bawah daun licin, pangkal daun meruncing, per-tulangan daun menyirip dan tepi daun rata (Gambar 2a). Bunga (*flos*) terletak aksilar atau muncul langsung dari rimpang, memiliki tangkai bunga yang pendek. Mahkota bunga (*corolla*) berbentuk memanjang, warna pangkal merah dengan ujung warna merah, dan warna tepi helaian mahkota bunga (*corolla*) berwarna kuning (Gambar 2b).

Gambar 2. Keseluruhan *Etlingera coccinea* (Blume) (a). Batang dan daun, (b). Bunga, (c). Buah

Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.

E. elatior memiliki rimpang berkayu, berada di dalam tanah, permukaan rimpang berwarna coklat kemerahan, daging rimpang berwarna putih, dan beraroma tajam. Batang (*pseudostem*) tegak memanjang secara horizontal, berwarna hijau dan permukaan batang licin. Daun (*lamina*) merupakan daun majemuk, tersusun berselang berbentuk bulat telur, permukaan atas licin, permukaan bawah kasap, berwarna hijau kekuningan, ujung

meruncing, pangkal daun membulat, pertulangan daun menyirip, dan tepi daun rata (Gambar 3a). Bunga (*flos*) muncul langsung dari rimpang, dengan tangkai bunga yang panjang berwarna merah berukuran 30 cm. Kelopak bunga (*calyx*) berbentuk lanset, permukaan licin, warna pangkal putih, bagian ujung runcing berwarna merah muda dan berbulu halus. Mahkota bunga (*corolla*) berbentuk lanset, warna pangkal putih dengan ujung warna merah muda. Buah berbentuk kapsul yang berkelompok, berwarna merah (Gambar 3b dan 3c).

Gambar 3. *Etlingera elatior* (Jack) R.M.Sm., (a). Batang dan daun, (b). bunga (c). Buah

***Etlingera nasuta* (K. Schum.) R.M.Sm.**

E. nasuta memiliki rimpang (*rhizome*) yang berada di bawah permukaan tanah, bentuk rimpang berdaging, berwarna putih dan beraroma halus. Batang (*pseudostem*) tumbuh tegak memanjang secara horizontal, berwarna hijau kecoklatan dengan permukaan licin. Daun (*lamina*) merupakan daun majemuk tunggal berselang, berbentuk lanset, berwarna hijau, permukaan atas dan bawah daun licin, pangkal daun meruncing, pertulangan daun menyirip, dan tepi daun rata (Gambar 4a).

Bunga (*flos*) terletak aksilar atau muncul langsung dari rimpang, berwarna merah, tidak beraroma. Kelopak bunga (*calyx*) berbentuk memanjang, permukaan licin, warna pangkal putih, bagian ujung runcing berwarna merah muda dan berbulu halus. Mahkota bunga (*corolla*) berbentuk memanjang, warna pangkal *corolla* putih dengan ujung *corolla* warna merah muda dan memiliki tangkai bunga yang pendek berukuran 2,3 cm, berwarna coklat (Gambar 4b).

Gambar 4. Keseluruhan *Etlingera nasuta* (K. Schum.) R.M.Sm., (a). Batang dan daun, (b). Bunga

***Globba atosanguinea* Teijsm. & Binn.**

G. atosanguinea merupakan herba berumpun yang tumbuh di daerah yang lembab. *G. atosanguinea* yang ditemukan memiliki tinggi 30 cm, bentuk rimpang berdaging, berwarna putih, dengan aroma rimpang yang halus. Batang (*pseudostem*) memiliki permukaan yang berbulu dengan warna batang merah keunguan (Gambar 5a). Daun (*lamina*) memiliki permukaan kasar berbulu halus baik itu permukaan bawah maupun permukaan atas pada daun, bentuk daun lanset dengan ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, pertulangan daun menyirip, dan tepi daun rata (Gambar 5a). Bunga (*flos*) terletak terminal atau berada diujung batang, ciri khasnya mempunyai warna bunga yang mencolok merah dan keorenan, tidak beraroma. Bunga tersusun majemuk dan mudah gugur bila disentuh (Gambar 5b).

Gambar 5. *Globba atosanguinea* Teijsm. & Binn., (a). Keseluruhan *G. atosanguinea*, (b). Bunga

***Hornstedtia reticulata* (K.Schum.) K.Schum.**

H. reticulata merupakan herba berumpun, memiliki tinggi 200 cm. Rimpang berada di atas permukaan tanah, permukaan rimpang licin, membulat berwarna coklat, warna daging rimpang coklat, tidak beraroma. Jenis ini memiliki akar tunjang yang berwarna coklat kemerahan, dengan permukaannya berbulu halus. Batang (*pseudostem*) tegak secara horizontal, dengan permukaan batang kasap berwarna hijau kecoklatan (Gambar 6a). Daun (*lamina*) berbentuk memanjang dengan permukaan daun bagian atas licin, bagian permukaan bawah kasap, berwarna hijau, pertulangan

daun menyirip, tepi daun rata, dan pangkal daun yang runcing (Gambar 6b). Bunga (*flos*) muncul dari rhizome dengan bunga berwarna merah dan berbentuk tabung dengan jarak yang rapat, terdiri dari 4-5 helaian mahkota bunga (*corolla*) yang memiliki panjang 4 cm, jenis ini tumbuh pada daerah yang lembab (Gambar 6c).

Gambar 6. Keseluruhan *Hornstedia reticulata* (K. Schum.) K. Schum., (a). Batang, (b). Daun, (c). Bunga, (d). Bakal buah

Zingiber multibracteatum Holttum

Z. multibracteatum merupakan herba berumpun yang memiliki tinggi tanaman 1-2 m dengan batang (*pseudostem*) yang tumbuh tegak memanjang secara horizontal, berwarna hijau, dengan permukaan batang licin (Gambar 7a). Bentuk rimpang berdaging, berwarna putih, dengan aroma yang halus. Daun (*lamina*) tunggal berselangseling, bentuk memanjang, permukaan atas daun licin dan bagian bawah kasap, pangkal daun meruncing, pertulangan daun menyirip, dan tepi daun rata (Gambar 7a). Bunga (*flos*) letaknya muncul langsung dari rimpang (*rhizome*), berwarna kuning kecoklatan. Warna bunga kuning pada awalnya dan menghasilkan bunga yang cokelat. Tangkai bunga yang panjang berwarna hijau keuningan, bunga berwarna kuning (Gambar 7b).

Gambar 7. Keseluruhan *Zingiber multibracteatum* Holttum, (a). batang dan daun, (b). bunga

Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.

Z. zerumbet merupakan tumbuhan herba berumpun, batang (*pseudostem*) tegak memanjang secara horizontal dengan tinggi sekitar 1-2 meter, berwarna hijau. Rimpang (*rhizome*) berdaging, berwarna orange pucat dan beraroma tajam. Daun (*lamina*) tersusun berselang, bentuk daun memanjang, pertulangan daun menyirip, tepi daun rata (Gambar 8a). Bunga (*flos*) terletak aksilar atau muncul dari *rhizome* dengan berwarna kuning atau putih pucat. *Bractea* berbentuk bulat telur dengan panjang 10 cm, berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi merah ketika sudah tua berwarna merah (Gambar 8b).

Gambar 8. Keseluruhan *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm., (a). Daun dan Batang, (b). Bunga

Pembahasan

Jenis *Zingiberaceae* yang paling banyak ditemukan adalah dari genus *Etlingera* yang terdiri dari 3 jenis, sedangkan jenis yang paling sedikit ditemukan adalah dari genus *Globba* dan *Hornstedia* yang masing-masing hanya ditemukan satu jenis. *Zingiberaceae* yang ditemukan di kawasan hutan tembakawang Desa Sumber Karya sebagaimana tertera pada Tabel 1 masih tergolong sedikit dari hasil penelitian menunjukkan bahwa spesies yang ditemukan sebanyak empat genus dari tujuh spesies dengan jumlah total individu sebanyak 57 individu, jika dibandingkan dengan penelitian *Zingiberaceae* di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang, Kabupaten Bengkayang oleh Sepito *et al.* (2019) yang dimana ditemukan enam genus dari 17 spesies dengan jumlah individu sebanyak 81 individu. Perbedaan jumlah *Zingiberaceae* yang diperoleh di dua lokasi penelitian yang berbeda tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan faktor fisik lingkungan, yaitu letak topografi, suhu dan kelembaban dua kawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pandey (2003) yang menyatakan bahwa *Zingiberaceae* dapat hidup dari dataran rendah sampai ketinggian 2000 m dpl terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 1) yang dilakukan di kawasan Hutan Tembawang Desa Sumber Karya, diketahui bahwa spesies *Zingiberaceae* yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini terdapat pada genus *Etlingera*, ini dikarenakan banyak ditemukan di areal terbuka atau hutan sekunder dan tumbuh secara mengelompok di tempat yang lembab. Hal ini sesuai dengan Larsen *et al.* (1999) dalam Nurainas & Yunaidi (2007) yang menyatakan bahwa secara alami *Etlingera* tumbuh mengelompok di tempat-tempat yang lembab dengan vegetasi yang cukup rapat yang mana bisa tumbuh dengan cepat seperti gulma. *Etlingera* merupakan salah satu genus yang tumbuh pada hutan sekunder atau hutan yang baru terbuka dan beberapa spesies dari genus *Etlingera* dapat dijadikan indikator kerusakan habitat.

Genus *Etlingera* yang ditemukan dalam penelitian terdiri dari tiga jenis yaitu *Etlingera coccinea*, *Etlingera elatior*, dan *Etlingera nasuta*. Spesies *Etlingera elatior* ditemukan di tiga kawasan hutan tembawang dengan masing-masing terdiri dari dua individu. Penyebaran *Etlingera elatior* ada pada tiga lokasi tersebut dapat terjadi karena bantuan hewan pemakan buah, buah pada *Etlingera elatior* memiliki warna yang menarik. Menurut Kato *et al.* dan Sakai *et al.* dalam Poulsen (2006), menyatakan bahwa polinasi *Etlingera* di Sumatera dan Borneo dibantu oleh lebah atau burung madu dan buah dimakan oleh hewan pengerat. Warna buah *Etlingera elatior* ada dua variasi yaitu, warna merah keunguan dan kuning kecoklatan, buah masak *Etlingera elatior* berwarna merah muda dan biji warna hitam dan menurut Poulsen (2006) buah *Etlingera elatior* merupakan buah majemuk dan warna buah merah, merah muda dan hijau kekuningan.

Spesies *Etlingera coccinea* memiliki individu sebanyak 9 individu, tetapi hanya terdapat di dua kawasan hutan tembawang yaitu tembawang Sibon dan tembawang beringin. Spesies *Etlingera nasuta* memiliki individu yang sedikit diantara genus *Etlingera* yang ditemukan, yaitu hanya 4 individu, dan hanya terdapat di kawasan hutan tembawang beringin. *Etlingera coccinea* dan *Etlingera nasuta* memiliki ciri khas bunga yang tenggelam sebagian di bawah permukaan tanah, pada penelitian dilapangan tidak ditemukan adanya buah dan penyebarannya tidak merata ada di setiap kawasan hutan tembawang. Menurut Dumbois dan Ellenberg (1974) menyatakan bahwa jenis yang memperbanyak diri dengan biji lebih luas penyebarannya jika dibandingkan

dengan jenis tumbuhan yang alat reproduksinya menggunakan organ vegetatif.

Hasil yang diperoleh menunjukkan ada beberapa genus yang memiliki satu jenis saja yaitu *Globba* dan *Hornstedtia*, hal ini disebabkan karena spesies dalam genus tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan genus lain untuk hidup dan berkembang dalam suatu kawasan dan dikarenakan jenis dalam genus ini perlu cahaya matahari yang cukup dibanding jenis lainnya. Loveless (1989) menyatakan bahwa suatu tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik jika kebutuhan fisiologinya terpenuhi dan lingkungan yang menyediakannya. Oleh karena itu, setiap tumbuhan mempunyai suatu kisaran toleran tertentu terhadap kondisi sekitarnya.

Genus *Globba* yang ditemukan yaitu dari spesies *Globba atrosanguinea* dengan jumlah individu sebanyak tiga individu terdapat di kawasan hutan tembawang Beringin dan dijumpai pada daerah lembab di pinggiran sungai. Menurut Van Valkenburg & Bunyapraphatsara (2002) menyatakan bahwa genus ini dapat tumbuh dari daerah rendah sampai daerah yang cukup tinggi, tetapi jenis ini lebih banyak ditemukan di daerah yang cukup ternaungi dan disepanjang daerah pinggiran sungai. Ciri umum untuk mengenal genus ini adalah letak dari perbungaannya terminal yang muncul langsung dari ujung batang dan bunganya yang berbentuk seperti sebuah anak panah. Menurut Poulsen (2006) jenis ini memiliki tinggi 0,5 meter, warna bawah daun pada saat masih muda berwarna keunguan, bunga agak mencolok dengan bunga kuning keorenan.

Genus *Hornstedtia* yang ditemukan yaitu *Hornstedtia reticulata* dengan jumlah individu sebanyak 18 individu yang terdapat di tiga kawasan hutan tembawang. Hal ini dikarenakan *Hornstedtia reticulata* ini dijumpai pada daerah dengan kelembaban 73.6-82.0%, jenis ini juga sering dijumpai dalam keadaan rusak karena dimakan oleh hewan. Menurut Whitmore (1984) menyatakan bahwa penyebaran yang luas dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, alat reproduksi, interaksi beberapa jenis dan kompetisi. Ciri khas dari genus *Hornstedtia*, yaitu pembungaan yang berbentuk kumparan dilapisi oleh bractea yang kompak menjadi pembeda dengan genus lainnya dan memiliki akar tunjang yang berada di atas permukaan tanah, karakter ini merupakan ciri khas yang jelas dari genus ini.

Genus *Zingiber* terdiri dari dua spesies yaitu *Zingiber multibracteatum* dan *Zingiber zerumbet*. Jenis *Zingiber multibracteatum* hanya ditemukan di kawasan hutan tembawang Beringin dengan individu sebanyak lima individu, sedangkan jenis *Zingiber zerumbet* ditemukan di dua kawasan hutan tembawang yaitu hutan tembawang Sibon dan hutan tembawang Nameng dengan jumlah individu sebanyak delapan individu. *Zingiber multibracteatum* dan *Zingiber zerumbet* ini penyebarannya tidak merata ada di tiga lokasi hutan tembawang Desa Sumber Karya, hal ini karena faktor lingkungan yang berbeda pada tiap kawasan hutan (Tabel 2). Selain itu, bunga juga dapat mempengaruhi dalam penyebaran genus *Zingiber*. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Nurainas dan Yunaidi (2007) yang menyatakan bahwa tempat tumbuh yang disenangi tumbuhan ini umumnya tempat-tempat lembab tapi beberapa jenis ada yang ditemukan pada hutan sekunder, hutan yang terbuka, pinggir sungai, dan kadang dapat tumbuh pada daerah terbuka dengan cahaya matahari penuh. Menurut Holtum (1950) yang menyatakan bahwa bunga *Zingiber* umurnya pendek dan bunga mekar pada pagi hari setelah itu menutup dalam beberapa jam. Selain itu, bunga *Zingiber* juga cepat mengalami kerusakan sehingga memungkinkan penyebaran *Zingiber* jarang terjadi sehingga jenis yang diperoleh di penelitian sedikit.

Karakter umum pada genus *Zingiber* yaitu bunga yang mudah rapuh, berbentuk tanduk. Menurut Kress *et al.* (2002) menyatakan bahwa genus *Zingiber* mudah dikenali dari bentuk bunga yang berbentuk tanduk. Menurut Nalawade *et al.* (2003) bunga kuning atau putih pucat, yang biasanya lebih panjang dari pada braktea, rapuh, dan hanya bertahan beberapa jam dan muncul dari braktea paling rendah terlebih dahulu, dan ketika habis bunga mengering dan jatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dumbois, D & Ellenberg, H, 1974, *Aims and Methods of Vegetation Ecology*, Wiley, New York
- Harum, F, 2012, *Manual Pelatihan: Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Masyarakat Pedesaan*, Jakarta (ID): PNPM Lingkungan Mandiri Pedesaan (PNPM-LMP)
- Holtum, RE, 1950, The *Zingiberaceae* of The Malay Peninsular, Gardens, Bulletin, Singapore
- Kress, WJ, Prince, LM, & Williams, KJ, 2002, The phylogeny and a new classification of the gingers (*Zingiberaceae*): Evidence from molecular data, *Jurnal Botany*, vol. 89, no. 11, hal. 1682–1696
- Lamb, A, Gobilik, J, Ardiyanti, M & Poulsen, AD, 2013, *A Guide To Gingers Of Borneo*, Natural History Publication, Kinabalu
- Larsen, K, Ibrahim, H, Khaw, SH & Saw, LG, 1999, *Gingers of Peninsular Malaysia and Singapore*. Natural History Publication, Kinabalu
- Loveless, AR, 1989, *Prinsip-Prinsip Biologi Tumbuhan Untuk Daerah Tropik*, PT Gramedia, Jakarta
- Nalawade, SM., Sagare, AP., Lee, CY., Kao, CL., & Tsay, HS, 2003, Studies on tissue culture of Chinese medicinal plant resources in Taiwan and their sustainable utilization. *Journal Botanical Bulletin Academia Sinica*, vol.31, no.1, hal.79-98
- Nurainas & Yunaidi, 2007, *Panduan Lapangan Jahe-jahean Liar di Taman Nasional Sibert*, Garisrastra, Padang
- Onrizal, 2005, Adaptasi Tumbuhan Mangrove Pada Lingkungan Salin dan Jenuh air, *Jurnal Biologi*, vol.4, no.6, hal 359-372
- Pandey, BP, 2003, *A Textbook of Botany: Angiosperm First Edition*, S Chand and Company, Ram Nagar, New Delhi, India
- Poulsen, AD, 2006, *Gingers of Sarawak*, Natural History Publication, Kota Kinabalu
- Rugayah, Elizabeth, Widjaja & Praptiwi, 2004, *Pedoman Pengumpulan Data Keanekaragaman Flora*, Pusat Penelitian Biologi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bogor
- Sepito, B, Fernando, T & Masitoh, S, 2019, Identifikasi Jahe-jahean (*Zingiberaceae*) di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, *Jurnal Hutan Lestari*, vol.7, no.1, hal.62-68
- Steenis, 2005, Buah Bit (Beta Vulgaris), Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Van Valkenburg & Bunyaphatsara, N, 2002, *Plant Resources of South-East Asia Vegetable oils and fats*, Bogor, Indonesia
- Whitmore, TC, 1984, *Tropical Rain Forests Of The Far East*, Second Edition, Oxford University Press, Oxford